♂ de Franceville, Congo, et j'ai aussi examiné un exemplaire ♀ provenant de Ssibange, Gabon, appartenant au Musée d'Hist. Nat. de Hambourg.

CORRIGENDA.

Dans l'article paru en 1894, Annales Soc. Ent. Belg. « *Nouveaux genres et espèces de la s. fam. des Plataspidinae* », il s'est glissé quelques erreurs d'impression : p. 260, au lieu de *Coptosoma Howathi* il faut lire *Coptosoma Horvathi* n. sp.; p. 261, le mot « *extérieure* » qui se trouve à la fin de la ligne 17 où il n'a aucun sens doit être rayé et placé à la fin de la 16e ligne où on lira : *à branche extérieure. etc.*; p. 266 tout au bas de la page, au lieu de *largeur 2 4/5 mill.*, il faut lire 2 3/4 *millimètres.*

LÉPIDOPTÈRES NOUVEAUX

DE LOJA ET ENVIRONS (ÉQUATEUR)

par **Paul Dognin.**

Lymanopoda Ignilineata n. sp. — 33 millimètres. Dessus d'un noir brun uniforme, les supérieures marquées de trois, les inférieures de cinq très petits points subterminaux jaunâtres, à peine distincts du fond. Dessous des supérieures noir brun avec quatre petits points subterminaux, les trois premiers jaunâtres, celui entre la 3 et la 4 d'un blanc pur; l'apex et le bord terminal légèrement liserés d'écailles violacées

Dessous des inférieures d'un brun plus chaud, traversé au delà de la cellule par une ligne ferrugineuse droite, l'aile au delà de cette ligne avec une large bordure d'un blanc violacé et finement liserée de brun. Les cinq petits points subterminaux reparaissent, les trois premiers jaunâtres, les deux inférieurs d'un blanc pur. Franges noir brun.

Antennes plus pâles, la massue noir brun; palpes très longs, couverts de longs poils bruns; dessus du corps concolore.

Loja; un spécimen bien frais.

Erosia Hendida n. sp. — 31 millimètres. Supérieures avec l'apex falqué et une seconde dent entre la 2 et la 3, formant une échancrure assez profonde; inférieures un peu arrondies à l'apex puis à bord terminal droit. Dessus des ailes avec la première moitié gris brun, la moitié extérieure gris roux; ces deux parties divisées nettement par une ligne rousse finement bordée de gris,

presque droite. Les ailes sont traversées par une série de lignes très menues, à reflets bleuâtres, particulièrement nombreuses dans la première moitié puis le long du bord terminal mais comme fondues dans le fond ; les supérieures ont en outre une série de cinq petits points subterminaux noirs placés entre les nervures et entourant l'échancrure apicale.

Dessous gris, teinté d'ochracé et légèrement strié de brun, la côte des supérieures ochracée ; pas de points subterminaux. Franges d'un brun roux.

Antennes filiformes ; palpes grêles ; tête et corps concolores.

Loja ; une ♀.

Sabulodes Tinonaria n. sp. — 29 à 32 millimètres. Port de *Sabulodes Arnissa* Druce. Les quatre ailes fauve roux, finement semées d'écailles plus foncées ; les supérieures avec un point cellulaire et les lignes presque comme dans *Arnissa* mais la deuxième et troisième écartées comme dans *Sabulodes Matrica* Druce ; les inférieures avec les deux lignes usuelles du groupe mais presque parallèles alors que dans *Arnissa* et *Matrica*, ces deux lignes sont beaucoup plus rapprochées ou même se touchent au départ du bord abdominal. Les quatre ailes avec une rangée subterminale de petits points nervuraux noirs. Franges concolores.

Dessous des ailes comme le dessus mais de teinte plus pâle, avec le point cellulaire (manquant parfois) et la ligne subterminale de points noirs sur la moitié antérieure des supérieurs seulement ; ces points y sont accompagnés d'une ombre noire.

Antennes filiformes ; palpes courts, à troisième article nu ; tête, corps et pattes concolores.

Loja ; sept ♂.

Sans la position différente des lignes j'aurais hésité à séparer cette espèce de *Sabulodes Arnissa*.

Sabulodes Granula n. sp. — 31 millimètres. Antérieures à apex pointu et bord terminal coudé ; secondes ailes arrondies, à bord assez profondément dentelé. Dessus des quatre ailes d'un jaune fauve pâle, saupoudré de quelques atomes noirs, avec le point cellulaire, une bordure subterminale double de points noirs, quelques points remplaçant la ligne extrabasilaire aux supérieures, enfin un petit point terminal à l'extrémité de la plupart des nervures. Franges concolores.

Dessous des ailes gris jaunâtre, avec les points cellulaires, une ombre subterminale noire plus large du double aux supérieures, enfin les petits points terminaux comme en dessus.

Antennes filiformes ; palpes assez longs, à dernier article grêle et nu ; tête et thorax couleur du fond (les segments de la base

noirs); abdomen avec quelques points noirs; pattes concolores.

Loja; une ♀.

Cette espèce me semble bien distincte de toutes celles que je connais.

Sabulodes Bermeja n. sp. — 32 millimètres. Antérieures à bord terminal coudé, inférieures arrondies, les quatre ailes assez pubescentes, profondément dentelées. Dessus fauve brun, semé d'atomes noirs et avec des petits points cellulaires. Les supérieures traversées par trois lignes brunes; une extrabasilaire assez droite, puis deux lignes qui quittent ensemble le bord interne vers le second tiers et se séparent, la seconde, plus sinuée, restant à peu près parallèle à l'extrabasilaire, la troisième obliquant extérieurement et atteignant la côte un peu avant l'apex. Une large tache subterminale noire entre la 2 et la 4 et un petit trait au bord interne avant l'apex complètent les dessins de ces ailes.

Les inférieures avec deux lignes faisant assez bien suite à celles des supérieures et aboutissant côte à côte au bord abdominal vers le dernier tiers. Ces ailes possèdent la tache subterminale entre la 2 et la 4 comme les supérieures mais beaucoup moins nettement dessinée.

Dessous des quatre ailes sauf les petits points terminaux noirs, comme dans *Sabulodes granula*, à ce point que malgré la différence des dessins du dessus je me demande si ce ne sont pas les deux sexes d'une même espèce?

Antennes assez fortement pubescentes; palpes comme dans *Granula*; corps et pattes concolores.

Loja; un ♂.

Sabulodes Ardilla n. sp. — 30 millimètres. Port de *Sabulodes Bermeja*. Les quatre ailes brun Van Dyck avec le point cellulaire noir cerclé de blanc. Les supérieures avec la côte coupée de blanc, deux lignes transversales plus foncées quittant le bord interne au second et troisième tiers mais suivant une direction divergente et deux fois plus éloignées l'une de l'autre à la côte qu'au bord interne. Une large tache subterminale saupoudrée de blanc entre la 2 et la 4; en face, intérieurement, une petite tache blanche, enfin quelques points subterminaux blancs.

Les inférieures avec la seconde ligne seulement (l'extracellulaire) et la tache subterminale entre la 2 et la 4, saupoudrées de blanc et bien indiquées. Franges brunes.

Dessous comme dans les deux précédentes espèces mais plus enfumé, les subterminales noires envahissant tout le bord aux supérieures et une partie de celui-ci aux inférieures; une large tache apicale blanche bien nette.

Antennes pubescentes; palpes assez longs, à dernier article grêle et nu; tête, corps et pattes concolores.

Loja; un ♂.

Sabulodes Rasata n. sp. — 42 millimètres. Ailes arrondies, à bord terminal denté, chocolat clair, possédant un point cellulaire noir largement entouré de blanc et des dessins formés de petites stries blanches agglomérées. Celles-ci sont clairsemées dans le centre de l'aile, plus fournies le long de la côte et nombreuses surtout le long du bord terminal. A l'angle interne des supérieures notamment elles forment une large nébuleuse blanche bien marquée. Franges blanches entre les nervures, chocolat clair à l'extrémité de celles-ci.

Dessous grisâtre, les points cellulaires bien marqués, une ombre terminale brune et à chaque aile une tache apicale pâle et une seconde tache plus large à l'angle interne et à l'angle anal. Franges comme en dessus.

Antennes finement pubescentes; palpes assez longs, à dernier article grêle et nu ; tête et corps concolores.

Loja; un ♂.

Sabulodes Maciza n. sp. — ♂ 36 à 39, ♀ 41 millimètres. Port trapu chez le ♂ dont les ailes supérieures ont le bord terminal assez droit et les inférieures légèrement coudées, ♀ avec les ailes plus allongées et coudées également aux supérieures.

Cette espèce semble très variable, du moins les deux ♂ que je possède sont fort diversement marqués. Celui que je prends pour type a les ailes jaune fauve et comme divisées en deux par une ligne plus foncée commune droite, partant du bord abdominal à peu près vers le milieu et atteignant la côte des supérieures avant l'apex. Intérieurement, aux supérieures, le point cellulaire; extérieurement, aux quatre ailes, une ligne subterminale courbe de points nervuraux.

Le second ♂ a le fond plus clair; la série de points subterminaux se transforme en ligne et tout l'espace entre celle-ci et la ligne commune prend une teinte brune plus foncée; enfin les supérieures offrent une troisième ligne (l'extrabasilaire) qui remonte du bord interne mais sans atteindre la côte. Franges concolores.

Les dessous sont semblables. Fond jaune avec le point cellulaire largement indiqué et une bande subterminale noire. Cette bande est plus large à la côte, fait un coude vers le bord terminal dans le milieu puis repart mais en diminuant. Antennes filiformes; palpes dépassant un peu la tête, à dernier article court et nu.

♀ d'un jaune fauve plus pâle que le ♂ type, avec les mêmes lignes et séries subterminales de points et en outre un gros point

noir entre la 3 et la 4, dessous comme dans les ♂. Antennes filiformes.

Loja; deux ♂ et une ♀.

Sabulodes Flavopuncta n. sp. — 33 millimètres. Supérieures légèrement coudées, inférieures arrondies et dentées. Dessus d'un blanc laiteux grisâtre, semé d'écailles noires et marqué de dessins fondus dans le fond, savoir : aux supérieures une extrabasilaire arrondie en dehors, une centrale presque droite, passant extérieurement mais à côté du point cellulaire (ces deux lignes couleur café au lait); enfin une subterminale blanche à peine visible, suivie de quelques points noirs. Les inférieures avec la subterminale blanche également très indistincte et suivie de quelques points noirs.

Aux supérieures le point cellulaire est noir; aux inférieures il est doublement plus gros, jaune et cerclé de noir. Franges concolores, coupées de noir à l'extrémité des nervures.

Dessous jaunâtre, strié de noir aux supérieures et à la côte des inférieures; les points cellulaires noirs sont plus gros aux premières ailes; les quatre ailes possèdent une bande subterminale noire, régulière aux inférieures, tourmentée et réduite vers l'apex des supérieures qui reste largement de la couleur du fond. Cette bande atteint les bords à l'angle interne des premières ailes, à l'apex et à l'angle anal des secondes. Les quatre ailes liserées de noir. Franges comme en dessus.

Antennes pubescentes; palpes dépassant un peu la tête, à dernier article grêle et nu; tête et corps concolores.

Zamora près Loja; un ♂.

Cette espèce se place tout auprès de *Quadrataria* Wlk.

Sabulodes Brumosa n. sp. — 25 millimètres. Supérieures à peine sensiblement coudées; inférieures arrondies et dentées. Petite espèce assez insignifiante dont les ailes, de teinte brune, possèdent le point cellulaire bien marqué, une ligne commune (la subterminale) sinuée et arrondie extérieurement et aux supérieures seulement, l'extrabasilaire. Ces lignes sont à peine distinctes du fond. Franges concolores.

Dessous gris avec le point cellulaire et une ombre subterminale, plus foncée.

Antennes crénelées; palpes deux fois aussi longs que la tête, à dernier article grêle et nu.

Corps et pattes concolores.

Loja; un ♂.

Acrosemia Espuma n. sp. — 43 millimètres. Port de

Vulpecularia H. Sch. et rappelant, très superficiellement d'ailleurs, par ses dessins la *Sabulodes Yelskii* Obth.

Dessus des ailes d'un beau jaune vif, semé de tous petits points noirs, de trois plus gros aux supérieures dont un cellulaire et également d'un cellulaire plus gros aux inférieures.

Les supérieures traversées d'une large ligne sinuée, d'un brun vineux, partant du bord interne un peu au delà du milieu, s'infléchissant d'abord intérieurement puis se dirigeant vers la côte qu'elle atteint juste au-dessous de l'apex. Extérieurement, à cette ligne, l'aile se colore de violacé; frange violette.

Quelques petits points blancs subterminaux sur les nervures dont quatre dans la région apicale. Les inférieures avec une bordure terminale violacée, la frange violette et une série ininterrompue de petits points subterminaux blancs sur les nervures.

Dessous comme le dessus mais sans la ligne aux supérieures, un seul plus gros point noir (le cellulaire) à ces mêmes ailes, dont la bordure terminale violacée s'épaissit vers l'apex; enfin le liseré terminal violacé plus pâle et plus vif.

Antennes filiformes; palpes courts, à troisième article distinct et nu; tête et thorax (très poilus) jaunes ainsi que le corps et les pattes.

El Monje, près Loja; un ♂ bien frais.

Herbita Niebla n. sp. — 39 et 44 millimètres. Supérieures avec l'apex assez pointu, et le bord terminal légèrement coudé, inférieures avec l'angle anal coupé assez droit. Dessus des ailes café au lait, plus pâle aux inférieures, avec quelques atomes noirs, un petit point cellulaire et une rangée subterminale de points nervuraux d'ailleurs peu distincts; les supérieures ayant la tache costale usuelle, blanche à centre café au lait, juste avant l'apex et traversées par cinq lignes presque fondues dans le fond, savoir : une extrabasilaire indistincte suivie d'une ligne au premier tiers mieux indiquée, une médiane juste après le point cellulaire suivie au second tiers d'une ligne plus large obliquant au sommet jusque vers l'apex, enfin une fine subterminale sinuée. Les inférieures n'ayant que deux lignes transversales, parallèles au bord : l'extracellulaire et la subterminale. Franges concolores.

Dessous d'un blanc jaunâtre tirant sur le fauve, avec le petit point cellulaire et une ombre subterminale brune, plus large au bord abdominal et au centre des supérieures, l'apex de ces dernières avec un petit point noir.

Antennes courtement pectinées; palpes obtus, dépassant à peine la tête, à dernier article très court; thorax velu, concolore ainsi que le corps et les pattes.

Loja et environs; deux ♂.

Apicia Bonita n. sp. — 23 à 25 millimètres. Port de *Cayennaria* Gn.; les quatre ailes très légèrement coudées à la 2, d'un fauve roux, les nervures pointillées de noir et la côte des supérieures jaunâtre. Les supérieures traversées par deux lignes, l'extrabasilaire, droite, quittant la côte au premier quart et atteignant le bord interne un peu avant le milieu; l'extracellulaire, à peu près parallèle au bord terminal et légèrement infléchie avant le bord interne. Les inférieures avec une ligne partant de l'angle anal et faisant suite à l'extracellulaire des supérieures. Ces lignes sont jaunâtres, bordées de roux, l'extrabasilaire extérieurement, la ligne commune intérieurement. Une tache cellulaire noirâtre aux supérieures. Les quatre ailes finement bordées de noir avec la frange jaune au départ, puis rousse.

Dessous des ailes d'un jaunâtre luisant semé d'atomes noirs le long de la côte et du bord terminal avec une ombre apicale plus foncée.

Palpes courts; antennes simples; tête et corps concolores.

Loja; huit ♂.

Cette espèce se place à côté de *Plebejata* Snell., avec laquelle elle a une certaine ressemblance ; mais sa teinte moins unie, ses ailes moins arrondies et la position toute différente des lignes l'en distinguent au premier examen.

Pyrinia Zizana n. sp. — 20 à 22 millimètres. Dessus jaune fauve, finement strié, avec la moitié extérieure des supérieures d'un ferrugineux violacé traversé par une subterminale marron et les dessins suivants également ferrugineux; aux supérieures deux taches centrales et un commencement de ligne quittant le bord interne au second tiers; aux inférieures, une fine ligne centrale peu sinuée et une ombre apicale donnant naissance dans quelques exemplaires à une ligne subterminale. Les supérieures avec la côte marron coupée de jaune et les franges ferrugineuses; les inférieures avec la frange un peu ferrugineuse à l'apex, puis jaune.

Dessous comme le dessus mais la subterminale des supérieures d'un gris plombé au départ de la côte; dans quelques exemplaires les dessins du dessous ont une tendance à se transformer en stries. Antennes à peine pubescentes; palpes dépassant très peu la tête; corps concolore.

Loja ; quatorze ♂.

Pyrinia Vanidosa n. sp. — 25 à 27 millimètres. Cette espèce est dessinée comme la précédente. Dessus des ailes d'un beau jaune vif, plus ou moins strié de ferrugineux suivant les individus. Les supérieures avec la moitié terminale ferrugineuse, la subter-

minale indiquée vers l'apex par un trait gris plombé et parfois distincte à l'arrivée au bord interne, les deux taches centrales bien marquées ainsi qu'une troisième, costale, vers le premier tiers. La côte coupée de brun et la frange ferrugineuse.

Les inférieures coupées par une ligne centrale, droite, faisant suite à la subterminale des premières ailes, l'apex ferrugineux donnant naissance à une ligne subterminale de points de même teinte. Frange ferrugineuse à l'apex, puis concolore.

Dessous comme le dessus, plus une ombre anale ferrugineuse aux secondes ailes.

Antennes finement pubescentes; palpes courts; tête et corps concolores.

Loja; huit ♂ et deux ♀.

Pyrinia Fulvatoides n. sp. — 21 à 23 millimètres. Dessus des ailes d'un fauve rougeâtre strié de ferrugineux, le bord terminal des supérieures et parfois jusqu'à la plus grande partie de ces ailes envahis d'une ombre ferrugineuse dans laquelle les lignes se voient à peine. Côte des supérieures plus claire avec quelques stries brunes. Les premières ailes avec deux lignes ferrugineuses; une extrabasilaire coudée extérieurement et la subterminale assez droite commençant à la côte avant l'apex par une petite traînée lilacée pour atteindre le bord interne vers le second tiers. Franges ferrugineuses.

Inférieures traversées par deux lignes droites et parallèles; une centrale faisant suite à la seconde des supérieures et une subterminale (dans la *Pyrinia Rufilaria* Hb. ces trois lignes sont beaucoup moins droites). Les inférieures sont d'une teinte uniforme et n'ont ni la base plus claire ni le bord terminal plus foncé comme dans la *Fulvata* de Warren. Franges fauve rougeâtre. Dessous plus clair que le dessus, avec le bord terminal des supérieures ferrugineux et la ligne marquée au travers de gris plombé, l'extrabasilaire à peine indiqué aux supérieures; les inférieures avec les deux lignes comme en dessus mais le bord terminal un peu plus foncé. Franges comme en dessus.

Antennes pubescentes; palpes dépassant peu la tête; corps concolore.

Loja; vingt ♂.

Se place auprès des *Pyrinia Rufilaria* Hb. et *Fulvata* Warren.

Pyrinia Yerma n. sp. — 18 à 22 millimètres. Ailes d'un rouge ferrugineux uni; les supérieures avec la côte brune coupée de ferrugineux, une fine subterminale d'un gris plombé quittant la côte peu avant l'apex, assez droite et atteignant le bord interne

au troisième quart et l'indication d'une extrabasilaire. Frange concolore.

Les inférieures avec une extracellulaire gris plombé légèrement infléchie, le bord terminal plus foncé et la frange plus claire. Dans quelques exemplaires, la plupart et parfois tous ces dessins se fondent dans le fond et disparaissent.

Dessous d'un jaune fauve rougeâtre strié, avec la côte coupée de brun et les bords interne et abdominal plus clairs ; les supérieures possèdent une ligne subterminale arquée d'un gris plombé au départ de la côte juste avant l'apex, puis ferrugineuse et aboutissant à l'angle interne (dans quelques exemplaires le bord terminal est complètement strié au delà de la ligne). Frange plus claire à l'apex et à l'angle interne. Les inférieures avec une fine médiane infléchie et une subterminale droite et dans quelques exemplaires, une troisième ligne entre ces deux. Frange concolore.

Antennes finement pubescentes ; palpes dépassant peu la tête. Corps concolore.

Loja et environs ; neuf ♂ dont un pris dans la vallée de la Zamora en décembre 1892.

Pyrinia Castana n. sp. — 23 à 25 millimètres. Ailes d'un ton châtaigne foncé, uniforme, la côte des supérieures coupée de noir et de jaunâtre, la frange concolore. On devine une médiane commune, arquée aux inférieures et une subterminale à ces dernières ailes ; mais ces lignes, d'un gris plombé, se distinguent à peine du fond.

Dessous jaune orange vif, strié de ferrugineux ; les supérieures avec la côte plus claire, striée de noir, la subterminale droite, gris plombé au départ de la côte et le bord terminal ferrugineux avec la frange de même teinte ; les inférieures avec une médiane et une subterminale ferrugineuses ; la frange jaune orangé.

Antennes finement pubescentes ; palpes dépassant un peu la tête ; dessus du corps concolore.

Loja ; cinq ♂.

Meticulodes pala n. sp. — ♂ 40 ♀ 44 millimètres. Dessus des premières ailes fauve, blanchâtre dans la partie costale, plus sombre et strié de brun dans la moitié inférieure, avec le point cellulaire blanc et deux lignes noires : l'extrabasilaire bien dessinée au départ du bord interne et faisant un crochet dans la cellule qu'elle ne dépasse pas ; la subterminale ondulée, parallèle au bord terminal et mieux écrite dans la partie inférieure. Quelques petits points noirs intranervuraux le long du bord terminal.

Dessus des inférieures gris fauve avec une subterminale noire

bordée de blanc extérieurement et la série de points intranervuraux noirs comme aux premières ailes. Franges concolores.

Dessous des supérieures avec le point cellulaire blanc développé, le bord interne et la moitié inférieure du bord terminal blancs, la subterminale indiquée mais pas d'extrabasilaire. Dessous des secondes ailes plus sombre que le dessus, avec un assez gros point cellulaire noir et blanc, la subterminale et l'indication de points subterminaux.

Antennes du ♂ pectinées mais à lames très courtes, antennes de la ♀ à peine pubescentes; palpes courts, à dernier article grêle et nu; thorax poilu; corps concolore.

Loja; une paire.

Perusia Paja n. sp. — 19 à 21 millimètres. Dessus des supérieures jaune paille pâle brillant, finement saupoudré d'atomes plus foncés et avec une série extracellulaire, parallèle au bord terminal, de petits points nervuraux; frange concolore. Dessus des inférieures blanc pur brillant, frange de même teinte.

Dessous blanc jaunâtre brillant avec les points nervuraux beaucoup mieux indiqués et se continuant aux inférieures en une ligne subterminale arrondie. Un point cellulaire à chaque aile. Franges concolores.

Antennes filiformes. Palpes droits, dépassant à peine la tête. Tête et thorax jaune paille; dessus de l'abdomen blanc.

Loja et environ; trois ♂ et une ♀.

J'ai également reçu de Loja les *Perusia Citrinata, Tenerata* Snell. et *Praecisaria* Herr. Sch.

Achlora Erina n. sp. — 38 à 41 millimètres. Port de *Rhodochlora Roseipalpis* Feld. et Rog. mais les angles plus obtus. Dessus des quatre ailes d'un vert pâle uni, avec la frange concolore. Les dessins, marqués en brun, se composent aux supérieures d'un point cellulaire, d'une tache apicale suivie d'une petite traînée fine aboutissant à un point sur la l', lequel n'est lui même que le commencement d'une ligne de points nervuraux placés aux deux ailes au delà du milieu. Dans un de mes exemplaires, cette série de points semble comme reliée par une ligne chevronnée intérieure à peine visible.

Dessous comme le dessus mais d'un vert blanchâtre plus clair et sans la série des points nervuraux.

Antennes pectinées mais à lames beaucoup plus courtes que dans *Roseipalpis* et le dernier quart filiforme; palpes courts, bruns; front terre de Sienne; dessus de la tête et thorax, verts; premiers anneaux de l'abdomen bruns en dessus.

Environs de Loja; deux ♂.

M. Schaus possède dans sa magnifique collection cette même espèce du Vénézuela et du Mexique. Elle existe également au British Museum, étiquetée Rio Janeiro.

Ophthalmophora Pepita n. sp. — 25 millimètres. Espèce très voisine de *Corinnaria* Gn., plus petite et le dessus des ailes d'un gris cendré et non brunâtre. La côte des supérieures est concolore, coupée seulement au second tiers par la tache triangulaire jaunâtre ; le bord interne a le milieu seul bordé de jaunâtre (dans *Corinnaria* cette bordure continue jusqu'à l'angle). Frange concolore.

Inférieures avec les mêmes dessins, les mêmes lignes argentées et les mêmes yeux noirs, à centre métallique et à iris ochracé que *Corinnaria*; mais le fond de l'aile reste gris cendré, la côte et le bord terminal seuls deviennent jaunes. Frange gris cendré.

Dessous d'un gris pâle uniforme, les dessins du dessus s'apercevant un peu aux inférieures par transparence; frange concolore. Dans *Corinnaria* au contraire, la frange devient jaunâtre sur la moitié apicale des inférieures.

Antennes pectinées; palpes courts, obtus; tête et corps gris cendré.

Loja; trois ♂.

De la même localité j'ai également reçu la *Corinnaria* typique.

Anisodes Zorra n. sp. — ♂ 23 et 24, ♀ 26 millimètres. Premières ailes à apex assez aigu, inférieures avec le bord terminal très légèrement coudé au centre. Dessus des ailes jaune d'ocre vif avec des stries et les dessins d'un roux ferrugineux. Les premières ailes traversées par une fine basilaire, une extrabasilaire arrondie extérieurement, une centrale assez droite et une subterminale sinuée. Deux taches partent de ces lignes : une petite entre la 1′ et la 2′ de la subterminale au bord terminal, une plus grande de la ligne centrale au bord terminal entre la 2 et la 4. Un point cellulaire.

Inférieures avec deux fines lignes seulement, une centrale et une subterminale, sinuées et arrondies ; le point cellulaire et une ombre à la base et à l'apex.

Dessous plus pâle avec les points cellulaires et les dessins du dessus très atténués ou même disparaissant en partie. Franges concolores.

Front ferrugineux ; tête entre les antennes jaune d'ocre ; thorax et corps concolore ; antennes plumeuses, à extrémité filiforme chez le ♂, filiformes chez la ♀ ; palpes courts, grêles et droits.

Loja ; quatre ♂ et une ♀.

Syllexis Nacarada n. sp. — 25 à 27 millimètres. Dessus

des ailes d'un blanc crêmé brillant saupoudré d'atomes gris blond; les supérieures traversées par trois lignes gris blond (extrabasilaire, centrale et subterminale) à peu près droites et parallèles; les inférieures par deux lignes seulement (centrale et subterminale). Un fin liseré noirâtre et un petit point cellulaire à chaque aile. Franges concolores.

Dessous grisâtre aux supérieures, blanchâtre aux inférieures, avec le point cellulaire et une ombre subterminale à chaque aile.

Antennes crénelées, à lames fines et assez courtes chez le ♂, filiformes chez la ♀; palpes courts, ne dépassant pas la tête; tête et collier blonds; thorax et dessus de l'abdomen blanc crêmé.

Loja, neuf ♂ et une ♀.

Acidalia Zoma n. sp. — 25 à 28 millimètres. Dessus des ailes d'un jaune paille uniforme, brillant, avec la frange concolore. Dessous un peu plus pâle, la côte des supérieures brunâtre et coupée, peu avant l'apex, par une traînée brune. Franges comme le fond.

Antennes filiformes; palpes droits, courts; tête et corps concolores.

Loja; cinq ♂.

Macaria Arenisca n. sp. — 30 à 32 millimètres. Les quatre ailes d'un gris crêmeux, pointillé de brun; les supérieures traversées par trois lignes qui, dans la plupart des exemplaires ne sont indiquées qu'au départ de la côte : une extrabasilaire, arrondie extérieurement, une centrale indistincte, une extracellulaire sinuée semant un point sur chaque nervure; enfin la côte marquée peu avant l'apex d'une assez large tache brune. Les inférieures traversées par quatre lignes; la basilaire, l'extrabasilaire bien dessinée, l'extracellulaire (marquant comme aux premières ailes les nervures d'un point) et la subterminale; ces lignes sont la plupart du temps fondues dans le fond.

Dessous plus jaunâtre que le dessus avec l'extrabasilaire et une subterminale à chaque aile, fortement dessinées, puis une basilaire et une médiane (sinuée) plus ou moins apparentes. Inférieures avec un petit point cellulaire (dessus et dessous) juste après l'extrabasilaire. Frange brunâtre aux supérieures, crêmeuse aux inférieures.

Antennes à peine pubescentes; palpes courts ne dépassant pas sensiblement la tête.

Loja; neuf ♂.

Cette espèce se place auprès d'*Adrasata* Snell. dont la teinte est plus sombre, unie et non pointillée de noir. *Arenisca* a en outre le bord terminal des supérieures plus droit.

Macaria areniscoides n. sp. — 26 à 29 millimètres. Cette espèce, très voisine de la précédente, a une teinte plus blonde, plus unie, avec les petits atomes noirs plus clairsemés; les supérieures ont la côte coupée de trois traits bruns à l'emplacement des lignes qui ne sont indiquées que par des points nervuraux, la tache subapicale est bien marquée. Les inférieures ont l'extrabasilaire assez visible, suivie du point cellulaire et d'une série de points nervuraux extracellulaires. Franges blondes, en partie brunâtres aux supérieures.

Dessous de teinte plus jaune et plus unie que dans *Arenisca* avec les mêmes dessins mais les lignes plus finement écrites (dans *Adrasata* Snell., la subterminale du dessous des deux ailes est deux fois plus large, moins nette et plus arrondie que dans *Arenisca* et *Areniscoides*).

Antennes à peine pubescentes; palpes plus longs que dans *Arenisca*, dépassant sensiblement la tête. Corps concolore.

Loja, Palanda et Zamora; dix-huit ♂.

Nipteria Musarana n. sp. — 28 à 30 millimètres. Dessus des supérieures gris souris traversé par une série de lignes brunes, plus ou moins marquées, savoir: une double extrabasilaire, une double centrale (celle-ci contenant le point cellulaire dans son milieu), une double subterminale (l'intérieure plus importante).

Dessus des inférieures également gris, traversé par trois lignes à peu près également espacées, la dernière plus arrondie et mieux dessinée. Franges concolores.

Dessous gris brillant, chaque aile avec un petit point cellulaire, la trace de deux lignes médianes, enfin une ombre.

Subterminale assez large. Apex des supérieures plus clair.

Antennes pectinées; palpes assez courts; tête jaune, thorax et dessus du corps gris.

Loja ; trois ♂.

Phibalapteryx Corteza n. sp. — 19 à 21 millimètres. Jolie petite espèce qui se place à côté de *Phibalapteryx Effluata* Snell., dont elle a le port et la taille. Le dessus des supérieures a le premier tiers fauve brun traversé de petites lignes noires ondulées, une large bande centrale blanche s'arrêtant à la nervure costale, contenant le point cellulaire et bordée extérieurement par une ligne noire ondulée; le reste de l'aile redevient fauve brun, traversé par une ligne subterminale blanche et semé de blanc le long du bord terminal qui est en partie liseré de noir; franges grisâtres. Suivant les individus, le blanc envahit une plus ou moins grande partie des ailes.

Dessus des inférieures blanc avec trois lignes transversales qui ne sont bien indiquées qu'au départ du bord abdominal, une ombre grise le long du bord terminal lequel est bordé par un liseré noir interrompu; franges grisâtres.

Dessous des quatre ailes grisaille, avec le point cellulaire et, aux supérieures, une ombre subapicale plus foncée. Franges concolores.

Antennes fortement pubescentes; palpes assez longs, squammeux; tête et dessus du corps fauve brun.

Loja et environs; dix-neuf ♂.

Phibalapteryx Coneja n. sp. — 22 et 23 millimètres. Dessus des supérieures gris ferrugineux traversé par diverses lignes sinuées d'un ferrugineux plus foncé, puis au dernier quart par deux lignes blanches, bien nettes, sinuées en V, parallèles au bord terminal; celui-ci est blanchâtre avec un fin liseré noir. Dessus des inférieures d'un crêmé luisant semé d'écailles ferrugineuses surtout le long du bord abdominal et notament chez la ♀. Bord terminal liseré de noir.

Franges grisaille.

Dessous grisaille, la ♀ plus sombre uniformément; les deux lignes blanches terminales se devinant plus ou moins.

Antennes courtes, légèrement pubescentes chez le ♂, filiformes chez la ♀; palpes longs, squammeux; dessus du corps concolore.

Loja; deux ♂ et une ♀.

Cidaria Kirschioides n. sp. — 30 à 34 millimètres. Cette espèce légèrement plus petite que *Cidaria Kirschi* Mss. (Stübel, Reise in Sud-Amerika, pl. 9, fig. 10) a le dessus des ailes, presque exactement pareil à celui de cette espèce. Dans les supérieures l'intensité des teintes varie extraordinairement, tantôt fonçant la ligne centrale, tantôt colorant presque toute l'aile. tantôt au contraire laissant le blanc dominer dans la partie terminale.

Kirschi a l'apex des inférieures teinté de noir, dans *Kirschioides* il reste toujours d'un blanc pur.

Mais en dessous les deux espèces se distinguent au premier coup d'œil. *Kirschi* a toute la partie apicale des supérieures jusqu'à la cellule et à la 4, noire avec une tache blanche apicale, une large costale qui atteint à peine la 2, enfin une double tache terminale entre la 2 et la 4. *Kirschioides* par contre a la tache costale qui se développe en ligne, atteint le bord terminal en dessous de la 2, fait un crochet et repart pour rejoindre le bord interne. Dans *Kirschi* les inférieures ont une assez large bordure noire de l'apex à la 2, *Kirschioides* ou reste blanc ou n'a qu'un très fin liseré noir uniforme.

Antennes filiformes; palpes courts, droits.

Loja et environs; seize ♂.

Eubolia Ratona n. sp. — 22 à 24 millimètres. Dessus des supérieures gris souris avec le point cellulaire et un grand nombre de lignes plus foncées à peu près droites, parallèles au bord terminal et plus ou moins marquées suivant les individus. Dessus des inférieures d'un blanc grisâtre uni et luisant. Franges concolores.

Dessous des ailes grisâtre uniforme luisant et avec l'indication des quatre points cellulaires.

Antennes finement pubescentes; palpes assez longs, à bec triangulaire.

Loja et environs; vingt-neuf exemplaires tous ♂.